

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

ПИК

РІС

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Активна субстанция:

Naphthyl – N – Methyl Carbamate 5.2 g/100 g

Експципенти:

За пълния списък на експципентите, виж т. 6.1.

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Прах за кожа.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Видове животни, за които е предназначен ВМП

Кучета и котки.

4.2 Терапевтични показания, определени за отделните видове животни

За профилактика и лечение на ектопаразитози при кучета и котки, предизвикани от бълхи, въшки и кърлежи.

4.3. Противопоказания

Да не се използва в близост до риби и пчели.

Да не се използва при котки на възраст по-малки от два месеца.

4.4 Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП

Да се избягва попадането на продукта в очите на животното.

4.5 Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Не е приложимо.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните

Да се избягва вдишването на продукта, попадането му в очите и продължителния контакт с кожата на прилагания продукт. След употреба ръцете се измиват задължително.

4.6 Неблагоприятни реакции (честота и важност)

Не са известни.

4.7 Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

4.8 Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие

Да не се прилага едновременно с DEET, малатион, оксими, циметидин и фентоан.

4.9 Доза и начин на приложение

Опаковката се разклаща внимателно преди употреба. Прахът се нанася равномерно по цялото тяло на животното, срещу косъма, за да се осигури достигането на продукта до кожата. За кучета с малки размери (до 10 kg) са необходими 5 – 8 g прах, за кучета със средни размери (от 10 до 20 kg) са необходими 8 – 15 g прах, а за кучета с големи размери (над 20 kg) са необходими 15 – 25 g прах. За възрастни котки са необходими 6 – 9 g прах, а за малки котета 3 – 5 g прах. Продуктът не е предназначен за употреба при котки на възраст по-малко от два месеца. Повторното третиране се извършва след 2 – 3 седмици. За предотвратяване на реинвазиране е необходимо постелята на животното да бъде сменена с нова, поръсена с продукта.

4.10 Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

При евентуална проява на симптоми на токсичност, животното се третира с атропин в доза от 1 – 2 mg в зависимост от телесната маса.

4.11 Карентен срок

Не е приложимо.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

Фармакотерапевтична група: ектопаразитициди за външна употреба, включително инсектициди.

Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QP53AE01.

5.1 Фармакодинамични свойства

ПИК е широкоспектърен инсектицид на основата на карбарил (карбаматен инсектицид).

Карбарилът е холинестеразен инхибитор, но за разлика от органофосфорните инсектициди, той предизвиква по-бързо възвратимо инхибиране.

Карбарилът действа инсектицидно и акарицидно – контактно и чревно, върху мухи, комари, въшки, табани, пухо-перояди, пасищни кърлежи, аргазиди и др. Подобно на ФОС инхибира естеразите, по-чувствително холинестеразите, отколкото алилестеразата, но и редица други ензимни системи (ацетилфосфатази, сукцинатдехидрогенази).

5.2 Фармакокинетични особености

При проведени *in vitro* опити с мишки, е установено, че само около 1% от приложената доза карбарил, прониква през кожата за период от 8 часа. При използване на два различни метода, е установено, че при кожно приложение на карбарил в доза $4 \mu\text{g}/\text{cm}^3$, половината от времето на пенетрация е 10.34 часа за първия метод и 4.75 часа за втория метод. Съпоставена е дермалната пенетрация при млади и възрастни женски плъхове и не е установена възрастова зависимост.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

6.1 Списък на ексципиентите

Талк

6.2 Несъвместимости

Не са известни.

6.3 Срок на годност

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 2 години.

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 30 дни.

6.4 Специални условия за съхранение на продукта

Да се съхранява при температура между 15 °C и 25 °C. Да се съхранява в оригиналната опаковка. Да се пази от светлина. Да се съхранява на сухо място.

6.5 Вид и състав на първичната опаковка

Пластмасови флакони от 100 g, затварящи се с винтови пластмасови капачки.

6.6 Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

“Вет-партнерс” ООД

4270 Първомай, ул. “Иван Асен” № 25

Р. България

Телефон: +359887222492

Факс: +3593365923

8. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

**9. ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗА ЗА
УПОТРЕБА**

03.11.2010

10. ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

10/2015

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА

Не е приложимо.