

ПРИЛОЖЕНИЕ III
ЕТИКЕТ И ЛИСТОВКА

А. ЕТИКЕТ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

Стъклени флакони с гумена тапа и алуминиева капачка х 10, 20, 50 мл или 100 мл.
Пластмасови туби от 1 литър и 5 литра.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

ЦИПЕРМЕТРИН ФАРМА
CYPERMETHRIN FARMA

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ**Активни субстанции в 100 ml:**

Cypermethrin 10 g

Ексципиенти:

Polysorbate 80 20 g

Polyethylen glycolum PEG 400 70 g

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Разтвор за кожа.

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

Стъклени флакони с гумена тапа и алуминиева капачка х 10, 20, 50 мл или 100 мл.
Пластмасови туби х 1 литър и 5 литра.

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Говеда, овце, кучета и котки.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Инвазии от паразити чувствителни към циперметрин: За лечение на инвазия с кърлежи, бълхи, въшки и мухи при говеда, овце, кучета и котки. За лечение на краста.

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Само за употреба върху кожата.

	Степен на разтваряне с вода	Концентрация, която трябва да се приложи	Забележки
Едри преживни	1 : 1000	100 ppm	Напръскване на цялото тяло; изкъпване
Едри преживни	1 : 200	500 ppm	Напръскване по гръбнака на животното (от тила до основата на опашката) 0.5 литра/животно
Овце	1 : 1000	100 ppm	Искъпване
Кучета и котки	1 мл на литър вода	100 ppm	Напръскване от разстояние 15-20 см по дължината на гърба до овлажняване на косъма.

Преди употреба прочети листовката.

8. КАРЕНТЕН СРОК

Месо и вътрешни органи (говеда и овце) – 28 дни.

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за човешка консумация.

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

След първо отваряне на опаковката - годен до:....

След разтваряне, използвайте незабавно.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в оригинална опаковка.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина

Да се съхранява далече от източници на топлина.

Да се съхранява далеч от храни и напитки.

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО ИМА ТАКИВА

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

„ФАРМА ВЕТ” ООД, гр. Шумен ул.”Отец Паисий” № 40, тел/факс 054/ 801-215

16. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

№ 865 /30.10.2007 г.

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

П №

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Картонена кутия

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТЦИПЕРМЕТРИН ФАРМА
CYPERMETHRIN FARMA**2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ****Активни субстанции в 100 ml:**

Cypermethrin 10 g

Помощни вещества:

Polysorbate 80 20 g

Polyethylen glycolum PEG 400 70 g

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Разтвор за външно приложение.

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТАСтъклени флакони с гумена тапа и алуминиева капачка x 10, 20, 50 мл или 100 мл.
Пластмасови туби x 1 литър и 5 литра.**5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП**

Говеда, овце, кучета и котки.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Инвазии от паразити чувствителни към циперметрин: За лечение на инвазия с кърлежи, бълхи, въшки и мухи при говеда, овце, кучета и котки. За лечение на краста.

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Само за употреба върху кожата.

	Степен на разтваряне с вода	Концентрация, която трябва да се приложи	Забележки
Едри преживни	1 : 1000	100 ppm	Напръскване на цялото тяло; изкъпване
Едри преживни	1 : 200	500 ppm	Напръскване по гръбнака на животното (от тила до основата на опашката) 0.5 литра/животно
Овце	1 : 1000	100 ppm	Искъпване
Кучета и котки	1 мл на литър вода	100 ppm	Напръскване от разстояние 15-20 см по дължината на гърба до овлажняване на косъма.

Преди употреба прочети листовката.

8. КАРЕНТЕН СРОК

Месо и вътрешни органи (говеда и овце) – 28 дни.

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за човешка консумация.

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

След първо отваряне на опаковката - годен до:....

След разтваряне, използвайте незабавно.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в оригинална опаковка.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина

Да се съхранява далече от източници на топлина.

Да се съхранява далеч от храни и напитки.

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО ИМА ТАКИВА

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

„ФАРМА ВЕТ” ООД, гр. Шумен ул.”Отец Паисий” № 40, тел/факс 054/ 801-215

16. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

№ 865 /30.10.2007 г.

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

II №

В. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА ЗА:

Циперметрин фарма, Cypermethrin 10 g/100 ml, разтвор за кожа за говеда, овце, кучета и котки

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

“Фарма Вет” ООД гр.Шумен, ул. “Отец Паисий” №40

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Циперметрин фарма
Cypermethrin Farma

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Активна субстанция в 100 ml:

Cypermethrin 10 g

Ексципиенти:

Polysorbate 80 20 g

Polyethylen glycolum PEG 400 70 g

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Инвазии от паразити чувствителни към циперметрин: За лечение на инвазия с кърлежи, бълхи, въшки и мухи при говеда, овце, кучета и котки. За лечение на краста.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Не са наблюдавани странични реакции от приложението на продукта.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Говеда, овце, кучета и котки.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Само за употреба върху кожата.

	Степен на разтваряне с вода	Концентрация, която трябва да се приложи	Забележки
Едри преживни	1 : 1000	100 ppm	Напръскване на цялото тяло; изкърпване
Едри преживни	1 : 200	500 ppm	Напръскване по гръбнака на животното (от тила до основата на опашката)

			0.5 литра/животно
Овце	1 : 1000	100 ppm	Изкъпване
Кучета и котки	1 мл на литър вода	100 ppm	Напръскване от разстояние 15-20 см по дължината на гърба до овлажняване на косъма.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Продуктът е предназначен за употреба върху кожата, при стриктно спазване на всички указания за употреба.

10. КАРЕНТЕН СРОК

Месо и вътрешни органи (говеда и овце) – 28 дни.

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за човешка консумация.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява в оригинална опаковка.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина

Да се съхранява далече от източници на топлина.

Да се съхранява далеч от храни и напитки.

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 28 дни.

След разтваряне, използвайте незабавно.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Да не се яде, пие и пуши по време на работа. Да се съхранява отделно от храни, напитки.

- Да се избягва вдишване на мъгла и пари.
- Да се избягва директен контакт с кожата. Да се измият ръцете след употреба. При контакт ръцете да се измият обилно с вода.
- Да се избягва контакт с очите. При попадане в очите, незабавно да се изплакнат, обилно с вода. Препоръчително е да се използват ръкавици при работа с продукта.
- Да не се пипа мястото на приложение за период от 3-6 часа след третирането.
- Хора с установена свръхчувствителност към пиретроидните инсектициди трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт
- В случаи на инцидентно поглъщане, да се потърси медицинска помощ. В случаи на продължително кожно или очно дразнещо действие, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикета на продукта.

Бременност:

Не се прилага по време на бременност и лактация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Да не се употребява паралелно с други инсектициди

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Циперметринът е слабо токсичен при кожно приложение. Признаците на интоксикация при всички пътища на приемане са характерни за циано-индуцираните пиретроидни интоксикации и се характеризират със седация, атаксия, приведена походка, непостоянен тремор и конвулсии. Тези признаци на токсичност се появяват няколко часа след прилагане на дозата и се проявяват при оцелелите за период от 3 дни.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

26/11/2012

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.