

ЛИСТОВКА

1. Наименование на ветеринарния лекарствен продукт

Kiltix 1,25 g/0,28 g противопаразитна кашка за малки кучета
Kiltix 3,02 g/0,68 g противопаразитна кашка за средно големи кучета
Kiltix 4,50 g/1,013 g противопаразитна кашка за големи кучета

2. Състав

Активни вещества:

	Дължина	Маса	Propoxur	Flumethrin
Kiltix за малки кучета	38 cm	12,5 g	1,25 g	0,28 g
Kiltix за средно големи кучета	53 cm	30,2 g	3,02 g	0,68 g
Kiltix за големи кучета	70 cm	45 g	4,50 g	1,013 g

Жълта противопаразитна кашка.

3. Видове животни, за които е предназначен ВЛП

Кучета.



4. Показания за употреба

За лечение на кучета при опаразитяване с кърлежи (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) и бълхи (*Ctenocephalides canis / felis*) и за предпазване от повторно опаразитяване. След поставяне, кашката запазва ефективността си срещу кърлежи и бълхи в продължение на 7 месеца.

За опаразитени кучета и за кучета, при които съществува риск от смесено опаразитяване от бълхи и кърлежи. Ветеринарният лекарствен продукт е показан за употреба само когато е необходимо едновременно третиране срещу бълхи и кърлежи.

5. Противопоказания

Да не се използва при кученца под 3-месечна възраст.

Да не се използва при кучета с увреждания на кожата.

Да не се използва при животни с механична обструкция на храносмилателния тракт или пикочните пътища, бронхиална астма или други белодробни и сърдечносъдови заболявания, тъй като карбаматите могат да предизвикат контракция на гладката мускулатура.

Да не се използва при свръхчувствителност към активните вещества, или към някои от помощните вещества.

6. Специални предупреждения

Специални предупреждения:

Децата трябва да избягват контакт с животни, носещи каишката.

Да се съхранява далеч от храна и фураж.

Каишката да не се използва за игра, в частност от деца.

Каишката да не се дъвче или смуче, в частност от деца.

Каишката е за външна употреба като акарицид и инсектицид и не трябва да бъде погълтана от кучета.

Трябва да се обмисли вероятността други животни в домакинството да са източник на повторно опаразитяване с бълхи и кърлежи, и при необходимост, те да бъдат третирани с подходящ продукт.

Специални предпазни мерки за безопасна употреба при видовете животни, за които е предназначен ВЛП:

Кърлежите, попаднали върху кучето ще бъдат убити и ще паднат в рамките на 72 часа, обикновено без да са смукали кръв. Прикрепянето на единични кърлежи не е изключено.

Поради тази причина, предаването на заразни заболявания от кърлежи не може да бъде напълно изключено при неблагоприятни условия.

Специални предпазни мерки, които трябва да вземе лицето, прилагащо ветеринарния лекарствен продукт на животните:

След работа с каишката, ръцете да се измиват старателно с вода и сапун.

Хора с установена свръхчувствителност към активните вещества proroxur и flumethrin или към някое от помощните вещества трябва да избягват контакт с ветеринарния лекарствен продукт.

Да се избягва контакт с кожата и очите.

Да не се пие, яде или пуши по време на работа с продукта.

Този ветеринарен лекарствен продукт съдържа карбамат (proroxur). При симптоми на отравяне, моля потърсете медицинска помощ.

Специални предпазни мерки за защита на околната среда:

Този продукт е силно токсичен за водни организми, птици и пчели.

Да не се допуска кучета с поставени каишки да плуват във водни басейни, в които има водни организми.

Този продукт може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

Да не се замърсяват реки, речни корита, язовири, резервоари и други водоизточници с неизползвания продукт.

Опаковката да не се използва повторно. Празните опаковки трябва да бъдат унищожени или изхвърлени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

Бременност и лактация:

Няма подробна информация за употребата по време на бременност и лактация. Двете активни вещества не са класифицирани като ембриотоксични, тератогенни или репродуктивно токсични, от което следва, че не се очакват подобни ефекти при бременни и лактиращи кучета.

Взаимодействие с други ветеринарни лекарствени продукти и други форми на взаимодействие:

Да не се използва каишката едновременно с други акарициди и инсектициди.

Предозиране:

Поради естеството на каишката, предозирането е невъзможно и не се очакват признаци на предозиране.

Проведени са множество контролирани опити при кучета от различни породи, възраст и тегло чрез поставяне на две каишки Kiltix едновременно. Това не е довело до никакви признаци на локална или системна непоносимост (биохимични и хематологични показатели, холинестераза, състояние на урината, поведенчески реакции).

При случайно поглъщане или дъвчене на каишката е възможно да се появят симптоми на карбаматно отравяне, като повишено слюноотделяне, свиване на зениците, повръщане и разстройство. При клинични признаци на карбаматно отравяне се прилага симптоматично лечение и антидот атропин интравенозно.

7. Неблагоприятни реакции

Кучета:

Много редки (по-малко от 1 на 10 000 третирани животни, включително изолирани съобщения):

Загуба на козина в мястото на приложение, Сърбеж в мястото на приложение, Лезия в мястото на приложение, Зачервяване на мястото на приложение, Промяна на кожата в мястото на приложение
--

Поведенческо разстройство, Безпокойство

Диария ¹ , Хиперсаливация ¹ , Повръщане ¹
--

Сърбеж ² , Зачервяване на кожата ²
--

Летаргия

¹Може да се появят след контакт на ветеринарния лекарствен продукт с устата. Ако се появят тези симптоми, каишката трябва да се свали незабавно.

²Може да се появят при някои животни след поставяне на каишката.

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на продукта. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарния лекарствен продукт не действа, свържете се първо с Вашия ветеринарен лекар. Можете също да съобщавате неблагоприятни реакции на притежателя на разрешението за търговия, като използвате данните за контакт в края на тази листовка или чрез Вашата национална система за съобщаване: {подробности за националната система}.

8. Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение

Малки кучета – една каишка с дължина 38 cm (12,5 g).

Средно големи кучета - една каишка с дължина 53 cm (30,2 g).

Големи кучета - една каишка с дължина 70 cm (45 g).

Само за външно приложение.

Каишката е ефективна в продължение на 7 месеца, когато се носи постоянно.

Продължителността на ефикасност зависи от дължината на козината, активността на животното и степента на опаразитяване на заобикалящата среда.

Извадете противопаразитната каишка от опаковката и я развийте.

Уверете се, че няма остатъци от пластмасовите конектори от вътрешната ѝ страна.

Поставете каишката около врата на животното без да я стягате прекалено (трябва да е възможно да се поставят два пръста между каишката и врата на животното).

Изтеглете остатъка от каишката през халката и отрежете излишната част на 2 cm от халката.

Правилно поставената каишка трябва да се проверява и регулира периодично.

Преди къпане и плуване, каишката трябва да се сваля и да се поставя, когато козината на кучето изсъхне. Каишката трябва да се носи постоянно. Ефективна е, независимо от това дали кучето се движи или е в покой.

Кърлежите, попаднали върху кучето ще бъдат убити и ще паднат в рамките на 72 часа, обикновено без да са смукали кръв. Прикрепянето на единични кърлежи не е изключено. Поради тази причина, предаването на заразни заболявания от кърлежи не може да бъде напълно изключено при неблагоприятни условия.

9. Съвети за правилното прилагане на продукта

Кучетата с гъста, сплъстена или мазна козина трябва да бъдат изкъпани с шампоан, преди поставяне на каишката. Често повтарящо се мокрене (дъжд, плуване, къпане) може да повлияе върху ефективността на каишката.

Ефективността и продължителността на действие на каишката зависят както от дължината, гъстотата и състоянието на космената покривка, така и от степента на опаразитеност. При необходимост каишката може да бъде заменена преждевременно, ако ефективността ѝ е намалала.

Загубата на активност може да бъде проверена, като се надраска повърхността на каишката с остър метален предмет. Ако мястото на надраскването е бяло на цвят, каишката е все още активна.

Бълхите често инфестират постелките, килимите и завесите в помещенията, които животните обитават. Поради това е необходимо те да бъдат обработвани периодично с инсектициди и да бъдат почиствани с прахосмукачка. Това ще доведе до намаляване на бълхите в заобикалящата среда и ще удължи периода на ефикасност срещу ново опаразитяване.

10. Карентни срокове

Не е приложимо.

11. Специални условия за съхранение

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Този ветеринарен лекарствен продукт не изисква никакви специални условия за съхранение.

Да не се използва този ветеринарен лекарствен продукт след изтичане срока на годност, посочен върху картонената кутия след Exp. Срокът на годност отговаря на последния ден от този месец.

Срок на годност на крайния ветеринарен лекарствен продукт: 3 години.

Срок на годност след първото отваряне на първичната опаковка: каишката трябва да се постави непосредствено след отваряне на опаковката.

12. Специални предпазни мерки при унищожаване

Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.

Ветеринарният лекарствен продукт не трябва да бъде изхвърлян във водни басейни, тъй като ргорохиг и flumethrin могат да бъдат опасни за риби и други водни организми. Да не се замърсяват реки, речни корита, язовири, резервоари и други водоизточници с неизползвания продукт.

Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички национални системи за събиране, приложими за съответния ветеринарен лекарствен продукт. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар как да унищожите ненужни ветеринарни лекарствени продукти.

13. Класификация на ветеринарните лекарствени продукти

Да се отпуска без лекарско предписание.

14. Номера на разрешението за търговия и размери опаковки

0022-2333

Картонена кутия с 1 каишка във фолиева опаковка.

15. Дата на последната редакция на текста

11/2024

Подробна информация за този ветеринарен лекарствен продукт може да намерите в базата данни на Съюза относно продуктите (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Данни за връзка

Притежател на разрешението за търговия и данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:

Elanco Animal Health GmbH, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Германия

Тел: +48221047815

PV.BGR@elancoah.com

Производител, отговарящ за освобождаването на партиди:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel, Германия



Recoverable Signature

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП

Signed by: KRASIMIR YANKOV ZLATKOV